

Les psychoses délirantes aiguës


Cours du Dr Cherick

Le 05.02.2009

1 critère de définition :

- délire & Hallucination

2 Introduction-Définition



Éclosion soudaine d'un délire transitoire polymorphe dans ses thèmes et ses mécanismes, vécue comme une expérience imposée au sujet associé à des troubles de l'humeur du comportement et de la conscience(accès désorientation spatio-temporelle)

Urgence psychiatrique ++++

Pronostic car 1/3 évolue vers

✓

schizophrénie

↓

Psychose maniacodépressive

3 étude clinique

- Début brusque et soudain (r trait marquant /r) :
- Prédominance féminine(2 F, 1 H)

- À l'adolescence, adulte jeune 20-35 ans
- Délire d'emblée (il s'éclate)
- Phase prodromique précédant de quelques semaines(Folin) :
Troubles de l'humeur dépressifs, troubles du sommeil, des émergences anxieuses.
- Dans ts les cas se joue une rupture flagrante entre un avant et un après=>l'incompréhension des proches est habituelle.

4 phase d'état

Délire : “tel malade qui était hier ambitieux est aujourd'hui persécuté, ds qqes jrs il sera hypocondriaque”

- Le délire parano est systématisé, es autres non
- Il est intensément vécu
- Le thèmes et mécanismes sont polymorphes et multiples, se succèdent, s'intriquent, s'additionnent, sans aucune systématisation, chevauchant donnant une totale incohérence des propos

Cet état traduit à l'observateur une *transformation profonde et irréductible* d'un monde qui a perdu sa contingence