

Législation (code de la santé publique, Art 4311-5 dans le cadre du rôle propre)

- n° 4 : aide à la prise médic
- n°5 : vérification de la prise de médicaments
- n°6 : surveillance de leurs effets et éducation du patient.

La thérapeutique médicamenteuse chez la PA est 1 outil permanent.

L'IDE

- évalue
- surveille l'effet des thérapeutiques, informe, intervient sur l'effet des thérapeutiques.
- informe
- intervient sur l'effet des thérapeutiques

L'IDE doit pour se faire être en mesure de comprendre et de connaître tous les facteurs qui peuvent influencer la réponse des PA aux thérapeutiques. Les PA sont + vulnérables aux effets 2nd des médicaments.

Les facteurs qui en sont responsables sont :

- la sénescence,
- la marge thérapeutique de CQ,
- les polypatho qui conduisent aux polymédicat°,
- la mvse utilisat°,
- la surconsommat°

Facteurs biologiques responsables de l'aug des risques associés à la conso de médic chez PA :

- les maladies chroniques,
- la pharmacocinétique (absorpt°, distribut°, métabolisme, élim se modif avec l'âge),
- autres facteurs
 - * liés directement à la PA (non observat° du ttt avec aug et dim des doses, arrêt ou prolongat° du ttt, non respect des horaires, oublis),
 - * solitude avec abs de réseau de soutien,
 - * sexe : les hommes sont bcp + scrupuleux que les femmes,
 - * le fait de devoir fractionner 1 ttt en pls prises
 - * le mq de résultats,
 - * abs de symptômes,
 - * mq de motivat°,
 - * peur des effets 2nd,
 - * l'ignorance,
 - * mq d'info.

Les erreurs :

- dues aux pertes de mémoire,
- " à 1 vis° déficiente,
- " à 1 abs de date de pérempt°,
- " au transfert de médic
- " à l'inaccessibilité des médic (situat° ds l'espace, prix).

La surconso de médic se définit comme tte conso qui ne coïncide pas avec 1 état de patho réel dûment identifié et qui ne concourt pas de façon efficace à son soulagement ou disparit°. Elle ne correspond pas à la qtté de médic absorbés ms à la légitimité de cette prise. Il semble que les PA abusent de médic prescrits / les méd ou en vente libre.

Le conditionnement des médic :

- la difficulté d'identifier ou d'utiliser les médic à cause de leur présentat° ou de leur conditionnement incite souvent les PA à moins bien obs les recommandat°,
- certaines PA ont des diff à avaler certaines formes de médic,
- " étiquettes st peu lisibles,
- " ordonnances " " .

Cpt à risque :

Parmi les cpt dangereux on peut retrouver :

- prendre des médic au mvs moment,
- doubler la dose qd 1 dose a été oubliée,
- ne pas renouveler l'ordonnance,
- non respect de la date de pérempt°,
- prise d'alcool avec médic.

L'inf est resp de / son rôle propre de la surveillance des réact° et des réponses du patient aux médic.

L'inf doit obs les effets attendus et reconnaître les réact° iatrogènes. On peut noter 4 complicat° majeures à la conso de médic :

- confus°
- chutes,
- immobilité,
- incontinence urinaire.

Conclusion

Le médicament est un outil très souvent utilisé. Ce n'est pas anodin et il en va du rôle propre IDE de prendre garde à la surconsommation